

Que sont les mesures de précaution ?

- En quoi consistent-elles ?

Les mesures de précaution (isolement) sont des mesures à prendre chez les patients dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils sont atteints d'une maladie infectieuse ou qu'un germe résistant aux traitements antibiotiques a été détecté.

- Pourquoi ces mesures sont-elles prises ?

Ces mesures sont prises pour éviter la transmission à d'autres patients.

- Que faut-il faire ?

Le patient, pendant son hospitalisation, doit rester dans sa chambre afin d'éviter la transmission d'un patient à l'autre.

- Comment faire ?

Avant d'entrer dans la chambre :

1. Se désinfecter les mains avec une lotion alcoolique.
2. Mettre une blouse d'hôpital.
3. Utiliser des gants si nécessaire à l'intérieur de la chambre (si vous effectuez l'hygiène du patient ou vous l'aidez aux besoins de toilette au chevet).
4. Si le patient souffre d'une infection respiratoire, touse ou éternue, vous devrez utiliser un masque conformément aux instructions affichées sur la porte de la chambre.

Avant de quitter la chambre :

1. Retirez les gants (jetez-les à la poubelle).
2. Retirez la blouse (jetez-la dans le sac prévu à cet effet).
3. Désinfectez-vous les mains à l'aide d'une lotion alcoolique.

A l'extérieur de la chambre :

1. Si vous portez un masque, retirez-le.
2. Désinfectez-vous les mains à l'aide d'une lotion alcoolique.

- Que faut-il faire lorsque le patient sort de l'hôpital ?

Les mesures de précaution (isolement) sont prises à l'hôpital pour éviter la transmission entre les patients, une fois que le patient est à domicile, il n'est pas nécessaire de porter une blouse ou des gants, car il n'y a aucun risque de contagion pour d'autres patients.